

الجلسة الخامسة - المثقوبات

II - المثقوبات Trematoda

تنتمي إلى شعبة الديدان المنبسطة.

الصفات العامة للمثقوبات:

- جسمها منبسط شبيه بورقة الشجر.
- خنثى، ما عدا المنشقات *Schistosoma*.
- تملك جهاز هضمي وإفراغي وعصبي بدئي.
- جميعها تحتاج لإكمال دورة حياتها إلى ثوي وسط واحد أو أكثر.

الثوي الوسيط

القواقع Snails.

تصنيف المثقوبات حسب شكلها:

- وريات Distoma.
- منشقات الجسم Schistosoma.

تصنيف المثقوبات حسب مكان تطفلها:

كبدية، معوية، دموية، رئوية.

تتميز البيوض بوجود:


- إما قلنسوة Operculum (في الوريات): مكان خروج الجنين بعد اكتمال نضجه.
- أو مهماز Spine (في منشقات الجسم): ويكون قطبياً أو جانبياً، يفيد في تثبيت البيضة على مكان التطفل.

البرشاش شكل سمكة بلا مصفوف

① الوريقة الكبدية *Fasciola hepatica* ^{كبدية}

الثوي النهائي: الحيوانات العاشبة ونادراً الإنسان.

مكان التطفل: الأتنية الصفراوية الكبدية.




الشكل البالغ لوريفة الكبدية
طولها (2-3 سم)


الطور البالغ: تشبه ورقة الشجر، لها فتوة أمامي صغير مخروطي الشكل، طولها 2-3 سم، لونها يشبه لون الكبد الطبيعي ويصعب تمييزها ضمنه، لها محجم فموي وجهاز تناسلي مذكر ومؤنث.

البيضة:

- بيضاوية الشكل، كبيرة الحجم، أبعادها 140 X 75 ميكرون، لها غلاف رقيق وقنسوة.
- داخلها جنين مهذب غير ناضج خرج إلى المياه العذبة عند انفتاح القنسوة.



بيضة الوريقة الكبدية
75x140 ميكرون



المذنب: Cercaria:


- بسيط، طوله 3 ملم (الرأس 1 ملم، والذيل 2 ملم).
- الذيل بسيط غير مشقوق.



طريقة العدوى: تناول نباتات مائية (بقلة، خس)، والماء الحاوي على الطور المعدي (خليفة المذنّب Metacercaria).

دورة الحياة:

الطور البالغ (نوي نهائي) ← البيوض (نوي نهائي) ← جنين مهدب (نوي وسط) ← كيسة أبواغ Sporocysts (نوي وسط) ← ردييات Redia (نوي وسط) ← مذنّبات Cercaria (الماء العذب) ← خليفة المذنّب Metacercaria (الشكل المعدي).




دورة حياة الوريقة الكبدية

Schistosoma

المؤمنون: يؤمنون بالذي أنزل إليهم من ربهم



الصفات العامة للمنشقات:

- منفصلة الجنس ويحمل الذكر الأنثى في أخدود بطني أثناء التزاوج.
تحتوي بيوضها مهمازاً يساعدها في الانتقال بين الأنسجة.
تسبب داء البلهارسيا Bilharziosis.




ماہیہ و صقرم

دورة حياة المنشقات

منشقة الجسم اليابانية <i>S. japonicum</i>	منشقة الجسم المعوية <i>S. mansoni</i>	منشقة الجسم الدموية <i>S. haematobium</i>	
الذكر يحتضن الأنثى في ميزابة. لا يوجد على جسمها حراشف.	الذكر يحتضن الأنثى في ميزابة. يغطي جسمها الخارجي حراشف كثيرة العدد وكبيرة الحجم.	الذكر يحتضن الأنثى في ميزابة. يغطي جسمها الخارجي حراشف قليلة العدد وصغيرة الحجم.	الشكل البالغ
داء البلهارسيا الوريدية الشريانية.	داء البلهارسيا المعوية.	داء بلهارسيا المثانة أو داء بلهارسيا المجاري البولية.	المرض
الإنسان و الكلاب و القطط.	الإنسان.	الإنسان.	التنوي النهائي
الأوردة المساريقية المرتبطة بالأمعاء الدقيقة والغليظة، والشريان الرئوي.	الأوردة البابية الصغيرة المفرعة من القولون والمستقيم.	الأوردة الصغيرة الخاصة بالجهاز البولي.	مكان تطفل الشكل البالغ
- بيضوية صغيرة الحجم. - تقيس 70-90 X 45-65. - لها مهماز جانبي صغير جداً.	- إهليلجية وكبيرة الحجم. - تقيس 110-170 X 60-70. - لها مهماز جانبي كبير ومثلثي. - بداخلها جنين مهدب.	- إهليلجية وكبيرة الحجم. - تقيس 120-150 X 40-60. - لها مهماز كبير انتهائي. - بداخلها جنين مهدب.	البيوض
 مهماز جانبي صغير جنين مهدب غير ناضج بيضة منشقة الجسم اليابانية	 مهماز جانبي جنين مهدب غير ناضج بيضة منشقة الجسم المعوية	 جنين مهدب غير ناضج مهماز انتهائي بيضة منشقة الجسم الدموية	

المذنب

مشقوق الذيل يقيس 500-800 ميكرون.



بواسطة المذنبات عبر الجلد أو الغشاء المخاطي المبطن للقم (مياه السواقي).

طريقة العدوى

الأعراض

براز مخاطي مدمى.

براز مدمى مخاطي مع زحير.

ألم عند التبول.
ظهور دم مع القطرات الأخيرة
من البول.

التشخيص

البيوض في البراز بعد التكثيف
بالتريسيب.

البيوض في البراز بعد التكثيف
بالتريسيب.

البيوض في البول في قسمه
الأخير، ويفضل بعد الجهد.

الوقاية

عدم التبول والتغوط في المياه.